

IHRE NACHSORGETERMINE

Die vorgesehenen Nachkontrollen finden einen Tag, eine Woche, einen Monat und drei Monate nach der Behandlung statt.

Vereinbaren Sie dafür bitte Ihre Termine am Empfang.

1.

2.

3.

4.

Bitte zögern Sie nicht uns anzurufen, falls Sie Beschwerden haben sollten wie: starke Kopfschmerzen, Übelkeit, Erbrechen, plötzlicher Abfall der Sehschärfe, neu aufgetretenes Schleiersehen, neue, insbesondere plötzlich auftretende Schmerzen am operierten Auge, Wahrnehmungen von Blitzen, „Rußregen“ oder eines Schattens, der das Gesichtsfeld von außen her verengt.

HABEN SIE NOCH FRAGEN? WIR SIND 24H FÜR SIE DA:

DEUTSCHLAND

0800 8888 474

info@care-vision.de

www.care-vision.de

ÖSTERREICH

0800 30 40 40

info@care-vision.at

www.care-vision.at



IHRE LINSENBEHANDLUNG

VORBEREITUNG UND NACHSORGE

- MULTIFOKALLINSEN BEHANDLUNG
- MONOFOKALLINSEN BEHANDLUNG

CARE VISION
AUGENLASERKORREKTUREN

Liebe Patientin / lieber Patient, herzlichen Glückwunsch, dass Sie Ihr Leben ohne Brille und Kontaktlinsen beginnen. Erfahren Sie im Folgenden, was Sie beachten müssen.

AM TAG IHRER BEHANDLUNG

- Konsumieren Sie am Behandlungstag keinen Alkohol!
- Bitte erscheinen Sie zu Ihrem OP-Termin nüchtern. Das heißt, Sie sollten 6 Stunden vor dem Eingriff keine Nahrung mehr aufnehmen, und 2 Stunden vor dem Eingriff nichts mehr trinken.
- Bitte benutzen Sie kein Augen-Make-up, Parfum oder After-Shave!
- Bringen Sie eine Sonnenbrille mit zum Schutz der Augen. Ein Blendschutz wird nach der Behandlung als angenehm empfunden.
- Bitte kommen Sie mit einer Begleitperson zur Behandlung. Nach der Behandlung wird es ihnen nicht möglich sein ein Kraftfahrzeug zu führen.

NACH IHRER BEHANDLUNG

- Achten Sie auf eine ausreichende Händehygiene (Händewaschung / Händedesinfektion) vor Benutzung der Augentropfen.
- Nehmen Sie Ihre Augentropfen entsprechend dem Tropfenplan, falls von Ihrem Arzt nicht anders verordnet. Die richtige Anwendung der Augentropfen ist besonders wichtig, um einer Entzündung vorzubeugen.
- Halten Sie die Augentropfen-Flasche beim Eintropfen auf Abstand, um den Kontakt mit dem behandelten Auge zu vermeiden. Bitte wahren Sie einen zeitlichen Abstand von ca. 15 Minuten beim Verabreichen der unterschiedlichen Augentropfen. Nach dem Öffnen sind die Tropfen an einem sauberen Ort zu lagern und mit der Verschlusskappe zu verschließen. Bitte beachten Sie die Herstellerangaben auf dem Beipackzettel!
- Schonen Sie sich und Ihr Auge am Tag der Operation. Kurze Zeit nach der Operation lässt die Wirkung der Betäubung langsam nach, es kann daher zu einem leichten Fremdkörper- oder Sandkorngefühl kommen. In diesem Fall ist es wichtig, nicht am Auge zu reiben. Wir empfehlen Ihnen sich in den ersten Stunden nach der Operation auszuruhen.

- Falls Sie Schmerzen haben sollten, ist die Einnahme von z. B. Paracetamol oder Ibuprofen möglich.
- Drei Tage nach der Behandlung dürfen die Augen nicht mit Wasser, Shampoo oder Duschgel in Berührung kommen; achten Sie darauf vor allem, während Sie Ihre Haare waschen (z. B. Schwimmbrille beim Duschen).
- Nach der Behandlung sollten Sie 2 Wochen folgende Aktivitäten vermeiden, um Ihre Augen nicht zu gefährden: Schwimmen (Meer, Schwimmbad, Solarium und auch Sauna), Kontakt-, Ball- und Kampfsportarten, Reiben oder Kratzen am Auge, Augen-Make-up.
- Leichter Sport, wie zum Beispiel Laufen oder Fahrrad fahren ist bereits nach 3 Tagen erlaubt, wenn Sie durch einen ausreichenden Augenschutz (z. B. Sonnenbrille) dafür sorgen, dass Ihnen keine Fremdkörper in die Augen gelangen. Tätigkeiten in sehr staubiger und zugiger Umgebung sollten in der ersten Woche vermieden werden.
- Nach 24 Stunden hat sich das Auge teilweise erholt und die Sehschärfe verbessert. Allerdings ist die endgültige Stabilität erst nach mehreren Wochen erreicht. Schwankungen in der Sehschärfe sind also durchaus normal.

IHR TROPFENPLAN

	Dexapos Comod (Dexamethason)	Floxal (Ofloxacin)	Nevanac (Nepafenac) 1 mg/ml
Am Behandlungstag	alle 4 Stunden bis zur Nachtruhe	alle 4 Stunden bis zur Nachtruhe	–
1. Woche	4 x täglich	4 x täglich	4 x täglich
2. bis 3. Woche	2 x täglich	–	4 x täglich

Gilt soweit nicht anders verordnet. Bitte geben Sie jeweils einen Tropfen je Medikament in Ihr Auge.