

IHRE NACHSORGETERMINE

Die Nachsorgetermine finden bei der Behandlung, falls nicht anders empfohlen, fünf Tage, zwei Wochen sowie drei Monate nach dem Eingriff statt.

Vereinbaren Sie dafür bitte Ihre Termine am Empfang.

1.

2.

3.

Bitte zögern Sie nicht uns anzurufen, falls Sie Beschwerden haben wie: sehr starke Schmerzen, zunehmende Rötungen am behandelten Auge und akute Sehverschlechterung.

HABEN SIE NOCH FRAGEN? WIR SIND 24H FÜR SIE DA:

DEUTSCHLAND

0800 8888 474

info@care-vision.de

www.care-vision.de

ÖSTERREICH

0800 30 40 40

info@care-vision.at

www.care-vision.at



IHRE AUGENLASERBEHANDLUNG

VORBEREITUNG UND NACHSORGE

- PRK
- PTK
- CROSSLINKING

CARE VISION
AUGENLASERKORREKTUREN

Liebe Patientin / lieber Patient, herzlichen Glückwunsch, dass Sie Ihr Leben ohne Brille und Kontaktlinsen beginnen. Erfahren Sie im Folgenden, was Sie beachten müssen.

AM BEHANDLUNGSTAG

- Konsumieren Sie am Behandlungstag keinen Alkohol!
- Bitte benutzen Sie kein Augen-Make-up, Parfum oder After-Shave!
- Bringen Sie eine Sonnenbrille mit zum Schutz der Augen. Ein Blendschutz wird nach der Behandlung als angenehm empfunden.
- Bitte kommen Sie mit einer Begleitperson zur Behandlung. Nach der Behandlung wird es Ihnen nicht möglich sein ein Kraftfahrzeug zu führen.

NACH IHRER BEHANDLUNG

- Achten Sie auf eine ausreichende Händehygiene (Händewaschung/Händedesinfektion) vor Benutzung der Augentropfen.
- Nehmen Sie Ihre Augentropfen entsprechend dem Tropfenplan, falls von Ihrem Arzt nicht anders verordnet. Die richtige Anwendung der Augentropfen ist besonders wichtig, um einer Entzündung vorzubeugen.
- Halten Sie die Augentropfen-Flasche beim Eintropfen auf Abstand, um den Kontakt mit dem behandelten Auge zu vermeiden. Bitte wahren Sie einen zeitlichen Abstand von ca. 15 Minuten beim Verabreichen der unterschiedlichen Augentropfen. Nach dem Öffnen sind die Tropfen an einem sauberen Ort zu lagern und mit der Verschlusskappe zu verschließen. Bitte beachten Sie die Herstellerangaben auf dem Beipackzettel!
- Bis zum ersten Kontrolltermin dürfen die Augen nicht mit Wasser, Shampoo oder Duschgel in Berührung kommen; achten Sie darauf vor allem, während Sie Ihre Haare waschen (z. B. Schwimmbrille beim Duschen).
- Schonen Sie sich und Ihr Auge am Tag der Operation. Einige Stunden nach der Operation lässt die Wirkung der Betäubung langsam nach, es kann daher zu Fremdkörper- oder Sandkorngefühl, Brennen, Rötungen, sowie Tränenbildung kommen. In diesem Fall ist es wichtig, nicht am Auge zu reiben. Wir empfehlen Ihnen sich in den ersten Stunden nach der Operation auszuruhen.

- Falls Sie Schmerzen haben sollten, ist die Einnahme von z. B. Paracetamol oder Ibuprofen möglich.
- Bis zum ersten Kontrolltermin sollten Sie folgende Aktivitäten vermeiden, um Ihre Augen nicht zu gefährden: Schwimmen (Meer, Schwimmbad, Solarium und auch Sauna), Kontakt-, Ball- und Kampfsportarten, Reiben oder Kratzen am Auge, Augen-Make-up.
- Leichter Sport, wie zum Beispiel Laufen oder Fahrrad fahren ist bereits nach dem ersten Kontrolltermin erlaubt, wenn Sie durch einen ausreichenden Augenschutz (z. B. Sonnenbrille) da für sorgen, dass Ihnen keine Fremdkörper in die Augen gelangen. Tätigkeiten in sehr staubiger und zugiger Umgebung sollten in der ersten Woche vermieden werden.
- Nach einigen Tagen hat sich das Auge teilweise erholt und die Sehschärfe verbessert. Eine endgültige Stabilität der Sehschärfe ist erst nach mehreren Wochen erreicht, wodurch Schwankungen durchaus normal sind. Eine Teilnahme am Straßenverkehr ist erst wieder möglich, sobald ein ausreichendes Sehvermögen vorhanden ist.

IHR TROPFENPLAN

	Dexapos Comod (Dexamethason)	Floxal (Ofloxacin)	Hyló Comod (Künstliche Tränenflüssigkeit)	Nevanac (Nepafenac) 1 mg/ml
Am Behandlungstag	–	stündlich bis zur Nachtruhe	stündlich bis zur Nachtruhe	stündlich bis zur Nachtruhe
Bis zur Entfernung der Kontaktlinse (KL)	–	4 x täglich	stündlich	4 x täglich
Nach KL-Entfernung	4 x täglich	–	min. 10 x täglich je nach Bedarf	–
5. und 6. Woche	3 x täglich	–	min. 4 x täglich je nach Bedarf	–
7. und 8. Woche	2 x täglich	–	min. 4 x täglich je nach Bedarf	–
9. bis 12. Woche	1 x täglich	–	min. 4 x täglich je nach Bedarf	–

Gilt soweit nicht anders verordnet. Bitte geben Sie jeweils einen Tropfen je Medikament in Ihr Auge. Die künstliche Tränenflüssigkeit können Sie rezeptfrei in der Apotheke nachkaufen.